

# BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2007

MATHÉMATIQUES

Série S

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures

COEFFICIENT : 9

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1 à 5

**spécialité**

L'usage des calculatrices est autorisé selon les termes de la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.

1 feuille de papier millimétré sera mise à la disposition des candidats.

Le candidat doit traiter les QUATRE exercices.  
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Tournez la page S.V.P.

**Exercice 1 (4 points)**  
*Commun à tous les candidats*

Pour chacune des questions de ce QCM, une seule des trois propositions A, B ou C est exacte.  
Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Une réponse exacte rapporte 0,5 point. Une réponse inexacte enlève 0,25 point. L'absence de réponse n'apporte ni n'enlève aucun point.

Si le total est négatif, la note de l'exercice est ramenée à 0.

**Une urne contient 8 boules indiscernables au toucher, 5 sont rouges et 3 sont noires.**

1) On tire au hasard simultanément 3 boules de l'urne.

a) La probabilité de tirer 3 boules noires est :

A.  $\frac{1}{56}$                       B.  $\frac{1}{120}$                       C.  $\frac{1}{3!}$ .

b) La probabilité de tirer 3 boules de la même couleur est :

A.  $\frac{11}{56}$                       B.  $\frac{11}{120}$                       C.  $\frac{16}{24}$ .

2) On tire au hasard une boule dans l'urne, on note sa couleur, on la remet dans l'urne ; on procède ainsi à 5 tirages successifs et deux à deux indépendants.

a) La probabilité d'obtenir 5 fois une boule noire est :

A.  $\left(\frac{3}{8}\right)^3 \times \left(\frac{5}{8}\right)^3$                       B.  $\left(\frac{3}{8}\right)^5$                       C.  $\left(\frac{1}{5}\right)^5$ .

b) La probabilité d'obtenir 2 boules noires et 3 boules rouges est :

A.  $\left(\frac{5}{8}\right)^3 \times \left(\frac{3}{8}\right)^2$                       B.  $2 \times \frac{5}{8} + 3 \times \frac{3}{8}$                       C.  $10 \times \left(\frac{5}{8}\right)^3 \times \left(\frac{3}{8}\right)^2$ .

3) On tire successivement et sans remise deux boules dans cette urne. On note :

$R_1$  l'événement : « La première boule tirée est rouge » ;

$N_1$  l'événement : « La première boule tirée est noire » ;

$R_2$  l'événement : « La deuxième boule tirée est rouge » ;

$N_2$  l'événement : « La deuxième boule tirée est noire ».

a) La probabilité conditionnelle  $P_{R_1}(R_2)$  est :

A.  $\frac{5}{8}$                       B.  $\frac{4}{7}$                       C.  $\frac{5}{14}$ .

b) La probabilité de l'événement  $R_1 \cap N_2$  est :

A.  $\frac{16}{49}$                       B.  $\frac{15}{64}$                       C.  $\frac{15}{56}$ .

c) La probabilité de tirer une boule rouge au deuxième tirage est :

A.  $\frac{5}{8}$                       B.  $\frac{5}{7}$                       C.  $\frac{3}{28}$ .

d) La probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage sachant qu'on a obtenu une boule noire au second tirage est :

A.  $\frac{15}{56}$                       B.  $\frac{3}{8}$                       C.  $\frac{5}{7}$ .

### Exercice 2 (5 points)

Réservé aux candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité.

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . L'unité graphique est 2 cm.

Le but de cet exercice est d'étudier la similitude plane **indirecte**  $f$  d'écriture complexe:

$$z' = i\sqrt{2} \bar{z} + 2i\sqrt{2} - 2,$$

et d'en donner deux décompositions.

#### I) Restitution organisée de connaissances

On rappelle que l'écriture complexe d'une similitude plane **directe** autre qu'une translation est de la forme :  $z' = az + b$ , où  $a$  et  $b$  sont des nombres complexes, avec  $a \neq 1$ .

Déterminer en fonction de  $a$  et de  $b$  l'affixe du centre d'une telle similitude plane directe.

#### II) Première décomposition de $f$ .

Soit  $g$  la similitude plane **directe** d'écriture complexe :

$$z' = i\sqrt{2} z + 2i\sqrt{2} - 2.$$

- 1) Préciser les éléments caractéristiques de  $g$ . (centre, rapport, angle).
- 2) Déterminer une réflexion  $s$  telle que  $f = g \circ s$ .

#### III) Deuxième décomposition de $f$ .

- 1) Montrer que  $f$  admet un unique point invariant noté  $\Omega$ . Déterminer l'affixe  $\omega$  de  $\Omega$ .
- 2) Soit  $\mathcal{D}$  la droite d'équation :  $y = x + 2$ .  
Montrer que pour tout point  $N$  appartenant à  $\mathcal{D}$ , le point  $f(N)$  appartient aussi à  $\mathcal{D}$ .
- 3) Soit  $\sigma$  la réflexion d'axe  $\mathcal{D}$  et  $k$  la transformation définie par :  $k = f \circ \sigma$ .
  - a) Donner l'écriture complexe de  $\sigma$ .  
(Indication : on pourra poser  $z' = a\bar{z} + b$  et utiliser deux points invariants par  $\sigma$  pour déterminer les nombres complexes  $a$  et  $b$ .)
  - b) En déduire que l'écriture complexe de  $k$  est :  $z' = \sqrt{2} z + 2\sqrt{2} - 2$ .
  - c) Donner la nature de la transformation  $k$  et préciser ses éléments caractéristiques.
- 4) Déduire de ce qui précède une écriture de la similitude indirecte  $f$  comme composée d'une réflexion et d'une homothétie.

**Exercice 3 (4 points)**  
*Commun à tous les candidats*

Dans un plan muni d'un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on désigne par  $\mathcal{C}$  la courbe représentative d'une fonction  $f$  définie et dérivable sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$ ,  $f$  et  $f'$  ne s'annulant pas sur l'intervalle  $I$ .

On note  $M$  un point de  $\mathcal{C}$  d'abscisse  $x$  et d'ordonnée  $y = f(x)$ .

On désigne par  $T$  la tangente à la courbe  $\mathcal{C}$  au point  $M$ .

On rappelle qu'une équation de  $T$  est de la forme :  $Y = f'(x)[X - x] + f(x)$ .

**I) Question préliminaire**

1) Montrer que  $T$  coupe l'axe des abscisses en un point  $H$  dont l'abscisse  $X_T$  vérifie :

$$X_T = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

2) Montrer que  $T$  coupe l'axe des ordonnées en un point  $K$  dont l'ordonnée  $Y_T$  vérifie :

$$Y_T = f(x) - xf'(x).$$

**II)**  $k$  désigne un réel fixé non nul. On cherche à déterminer les fonctions  $f$  pour lesquelles la différence  $x - X_T$  est constante et égale à  $k$ , pour tout nombre réel  $x$ . (Propriété 1)

1) Démontrer que  $f$  vérifie propriété 1 si et seulement si  $f$  vérifie l'équation différentielle :

$$y' = \frac{1}{k}y.$$

2) En déduire la famille des fonctions vérifiant la propriété 1 et déterminer pour  $k = \frac{1}{2}$  la fonction  $f$  de cette famille qui vérifie de plus la condition :  $f(0) = 1$ .

**III)**  $k$  désigne un réel fixé non nul. On cherche à déterminer les fonctions  $f$  pour lesquelles la différence  $y - Y_T$  est constante et égale à  $k$ , pour tout nombre réel  $x$  appartenant à l'intervalle  $I = ]0, +\infty[$ . (Propriété 2)

1) Démontrer que  $f$  vérifie la condition posée si et seulement si  $f$  vérifie l'équation différentielle :

$$y' = \frac{k}{x}.$$

2) En déduire la famille des fonctions vérifiant la propriété 2 et déterminer pour  $k = \frac{1}{2}$  la fonction  $f$  de cette famille qui vérifie la condition :  $f(1) = 0$ .

### Exercice 4 (7 points)

Commun à tous les candidats

Le but de l'exercice est de montrer que l'équation (E) :  $e^x = \frac{1}{x}$ , admet une unique solution dans l'ensemble  $\mathbb{R}$  des nombres réels, et de construire une suite qui converge vers cette unique solution.

#### I) Existence et unicité de la solution.

On note  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = x - e^{-x}$ .

- 1) Démontrer que  $x$  est solution de l'équation (E) si et seulement si  $f(x) = 0$ .
- 2) Etude du signe de la fonction  $f$ .
  - a) Etudier le sens de variation de la fonction  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
  - b) En déduire que l'équation (E) possède une unique solution sur  $\mathbb{R}$ , notée  $\alpha$ .
  - c) Démontrer que  $\alpha$  appartient à l'intervalle  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ .
  - d) Etudier le signe de  $f$  sur l'intervalle  $[0, \alpha]$ .

#### II) Deuxième approche.

On note  $g$  la fonction définie sur l'intervalle  $[0, 1]$  par :  $g(x) = \frac{1+x}{1+e^x}$ .

- 1) Démontrer que l'équation  $f(x) = 0$  est équivalente à l'équation :  $g(x) = x$ .
- 2) En déduire que  $\alpha$  est l'unique réel vérifiant :  $g(\alpha) = \alpha$ .
- 3) Calculer  $g'(x)$  et en déduire que la fonction  $g$  est croissante sur l'intervalle  $[0, \alpha]$ .

#### III) Construction d'une suite de réels ayant pour limite $\alpha$ .

On considère la suite  $(u_n)$  définie par :  $u_0 = 0$  et, pour tout entier naturel  $n$ , par :  $u_{n+1} = g(u_n)$ .

- 1) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel  $n$  :  $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \alpha$ .
- 2) En déduire que la suite  $(u_n)$  est convergente. On note  $l$  sa limite.
- 3) Justifier l'égalité :  $g(l) = l$ . En déduire la valeur de  $l$ .
- 4) À l'aide de la calculatrice, déterminer une valeur approchée de  $u_4$  arrondie à la sixième décimale.